

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Бодрова В.В., Хаспекова С.Г., Шустова О.Н., Цветаева Н.В., Мазуров А.В. (2025)

Функциональная активность тромбоцитов у пациентов с иммунной тромбоцитопенией.

Биомедицинская химия, **71**(4), 288-299.

DOI: 10.18097/PBMCR1596




Рисунок S1. Выявление («гейтирование») тромбоцитов в цельной крови (А) и измерение ТА-IgG (Б, В). Проточная цитофлуориметрия. (А) – выявление «гейтирование» тромбоцитов по их размеру и окрашиванию CD42b-APC в крови ЗД. (Б) и (В) – связывание анти-IgG-ч-FITC антител с тромбоцитами ЗД и у пациента с ИТП соответственно. Представлены MFI (средняя интенсивность флуоресценции, у.е.) и уровень ТА-IgG в % от контроля у ЗД, принятого за 100%. (Подробнее – см. Материалы и методы).




Рисунок S2. ROC-кривые. Кровотечения у пациентов с ИТП и количество тромбоцитов (А), ТА-IgG (Б), РТ (В) и РАС-1+, % (Г, агонист TRAP 10 мкМ). Сравнивали пациентов в группах с 0/1 и 2/3 баллами по шкале кровотечений. Статистический анализ ROC-кривых – см. Таблицу 5 (основной текст).